arXiv:1404.6337v1 [math.CA] 25 Apr 2014

Comonotone Second Jackson's Inequality

Pleshakov Mikhail Gennad'evich, Saratov State University, Russia,
410012, Saratov, Astrakhanskaya st., 83, pleshakovmg@gmail.com

Abstract. Let $2s$ points $y_i = -\pi \le y_{2s} < \ldots < y_1 < \pi$ be given. Using these points, we define the points y_i for all integer indices i by the equality $y_i = y_{i+2s} + 2\pi$. We shall write $f \in \triangle^{(1)}(Y)$ if f is a 2π-periodic function and f does not decrease on $[y_i, y_{i-1}]$ if i is odd; and f does not increase on $[y_i, y_{i-1}]$ if i is even. We denote $E_n^{(1)}(f;Y)$ the value of the best uniform comonotone approximation. In this article the following Theorem – the comonotone analogue of second Jackson's Inequality – is proved.

Theorem. *If $f \in \triangle^{(1)}(Y) \bigcap \mathbb{W}^r$, $r > 2$, then*

$$E_n^{(1)}(f;Y) \le \frac{c}{n^r},$$

where $c = c(r,Y) = const$ depending only on r and Y, $\mathbb{W}^r$ Sobolev space.

Keywords: trigonometric polynomials, polynomial approximation, shape-preserving.

При каждом $r \in \mathbb{N}$ пусть $\mathbb{W}^r$ – класс 2π-периодических функций, имеющих $r-1$ абсолютно непрерывную производную и

$$|f^{(r)}(x)| \le 1, \text{ п.в. на } \mathbb{R}.$$

Будем рассматривать 2π-периодические функции $f \in \mathbb{W}^r, r \ge 2$.

Обозначим $\mathbb{T}_n, n \in \mathbb{N}$ - пространство тригонометрических полиномов вида

$$\tau_n(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{n} a_k \cos kx + b_k \sin kx, \quad x \in \mathbb{R}$$

порядка $\le n$.

Пусть на промежутке $[-\pi, \pi)$ заданы $2s$ точек y_i

$$-\pi \le y_{2s} < \ldots < y_1 < \pi.$$

Отправляясь от этих точек, при помощи равенства

$$y_i := y_{i+2s} + 2\pi$$

определим точки y_i для всех целых индексов i.

Обозначим $Y := \{y_i\}_{i=1}^{2s}$,

$$\Pi(x) := \prod_{i=1}^{2s} \sin \frac{1}{2}(x - y_i),$$

и заметим, что $\Pi \in \mathbb{T}_s$, т.е. Π - тригонометрический полином порядка s.

Пусть f – непрерывно дифференцируемая функция. Будем писать $f \in \triangle^{(1)}(Y)$, если

$$f'(x)\Pi(x) \ge 0, \quad x \in \mathbb{R}. \tag{1}$$

Положим

$$E_n^{(1)}(f;Y) := \inf_{\tau \in \triangle^{(1)}(Y) \cap \mathbb{T}_n} \|f - \tau\|.$$

В главе 2 доказывается

Т е о р е м а 1. *Если* $f \in \triangle^{(1)}(Y) \cap \mathbb{W}^r$, $r \geq 2$, *то*

$$E_n^{(1)}(f;Y) \leq \frac{c}{n^r}. \tag{2}$$

где $c = c(r,Y)$ *- постоянная, не зависит от* n *и* f.

З а м е ч а н и е 1. Теорема 1 верна и в случае $r = 1$, это следует из теоремы 1 [1]. Однако функция $f \in \mathbb{W}^1$ не обязана иметь непрерывную производную и поэтому в случае $r = 1$ множество $\triangle^{(1)}(Y)$ нуждается в отдельном определении. Теорема 1 является аналогом соответствующих результатов о комонотонном приближении непрерывных функций алгебраическими многочленами, полученных в работах [2-20].

Доказательство теоремы разобьем на несколько пунктов. Всюду далее через c_1, c_2, c_3, ... обозначены положительные числа (константы), которые зависят только от s или r или s и r, через $C_i = C_{i,l}$ обозначены положительные числа (константы), которые зависят только от s, r и l.

1^o. Некоторые обозначения.

Зафиксируем натуральное n и разобьем прямую $\mathbb{R}$ равноотстоящими точками

$$x_j := -\frac{j\pi}{n}, \quad j \in \mathbb{Z}.$$

Обозначим

$$I_j := [x_j; x_{j-1}], \quad h := \frac{\pi}{n}.$$

Л е м м а 1. *Пусть* $g \in \mathbb{W}^{r-1}$ *и пусть при некотором фиксированном* $j \in \mathbb{Z}$ *на каждом из* $2r-3$ *отрезков* $I_j, \ldots, I_{j+2(r-2)}$ *существует точка* $t_\nu \in I_\nu$, $\nu = \overline{j, j+2(r-2)}$, *такая, что*

$$|g(t_\nu)| \leq h^{r-1}, \tag{3}$$

тогда для любого $x \in \bigcup\limits_{\nu=j}^{j+2(r-2)} I_\nu$ *справедливо неравенство*

$$|g(x)| \leq c_1 h^{r-1}. \tag{4}$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим разделенную разность порядка $r-1$ функции g в узлах x, t_j, t_{j+2}, ... ,$t_{j+2(r-2)}$

$$[t_j, \ldots, t_{j+2(r-2)}, x; g] = \frac{g(t_j)}{(t_j - t_{j+2}) \ldots (t_j - t_{j+2(r-2)})(t_j - x)} + \ldots$$
$$+ \frac{g(t_{j+2(r-2)})}{(t_{j+2(r-2)} - t_j) \ldots (t_{j+2(r-2)} - t_{j+2(r-3)})(t_{j+2(r-2)} - x)} +$$
$$+ \frac{g(x)}{(x - t_j) \ldots (x - t_{j+2(r-2)})}.$$

Из условия $g \in \mathbb{W}^{r-1}$ леммы и свойств разделенной разности (см., например, [21, с. 13]) следует оценка

$$|[t_j, \ldots, t_{j+2(r-2)}, x; g]| \leq \frac{1}{(r-1)!}. \tag{5}$$

После тождественных преобразований получаем

$$|g(x)| \le \frac{|(x-t_j)\dots(x-t_{j+2(r-2)})|}{(r-1)!} + \\ + \left|\frac{g(t_j)(x-t_{j+1})\dots(x-t_{j+2(r-2)})}{(t_j-t_{j+2})\dots(t_j-t_{j+2(r-2)})}\right| + \dots \\ \dots + \left|\frac{g(t_{j+2(r-2)})(x-t_j)\dots(x-t_{j+2(r-3)})}{(t_{j+2(r-2)}-t_j)\dots(t_{j+2(r-2)}-t_{j+2(r-3)})}\right| \le \\ \le h^{r-1}\left(\frac{(2r-3)^{r-1}}{(r-1)!} + (r-1)(2r-3)^{r-2}\right).$$

Лемма доказана.

2^o. Разбиение индексов $j \in \mathbb{Z}$ на три типа.

Каждый из индексов $j \in \mathbb{Z}$ отнесем к одному и только одному из трех типов.

О п р е д е л е н и е 1. Индекс j назовем индексом первого типа и будем писать $j \in V_1$, если для любого $x \in I_j$ справедливо неравенство

$$|f'(x)| \le c_1 h^{r-1}, \tag{6}$$

обозначим

$$E_1 := \bigcup_{j \in V_1} I_j. \tag{7}$$

Индекс j назовем индексом второго типа и будем писать $j \in V_2$, если он не является индексом первого типа и для любого $x \in I_j$ справедливо неравенство

$$|f'(x)| \ge h^{r-1}. \tag{8}$$

Обозначим

$$E_2 := \bigcup_{j \in V_2} I_j. \tag{9}$$

Все остальные индексы отнесем к третьему типу и множество всех индексов третьего типа обозначим через V_3. Обозначим

$$E_3 := \bigcup_{j \in V_3} I_j. \tag{10}$$

Л е м м а 2. *Индексов третьего типа не может быть более* $2r-4$ *штук подряд.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Допустим от противного, что имеется $2r-3$ подряд индексов третьего типа $j, j+1, \dots, j+2(r-2)$. Это означает, что на каждом отрезке I_ν, $\nu = \overline{j, j+2(r-2)}$ найдется по крайней мере одна точка t_ν, для которой справедливо неравенство

$$|f'(t_\nu)| \le h^{r-1}.$$

По лемме 1 это значит, что для любого $x \in \bigcup\limits_{\nu=j}^{j+2(r-2)} I_\nu$ справедлива оценка

$$|f'(x)| \le c_1 h^{r-1},$$

а это противоречие, т.к. на множествах третьего типа должны быть точки y, в которых

$$|f'(y)| > c_1 h^{r-1}.$$

Лемма доказана.

3^o. Построение множества Ω.

Каждый набор индексов $j+1, \dots, j+\mu$, состоящий из не менее семи (т.е. $\mu \geq 7$) следующих подряд индексов второго типа назовем пачкой, если $j \overline{\in} V_2$ и $(j+\mu+1) \overline{\in} V_2$.

Если не существует ни одной пачки, то положим $W_1 := \mathbb{Z}$. Если пачки существуют, то каждый индекс j, не входящий ни в одну из пачек отнесем к одной из следующих двух групп : W_1 или W_2.

Если между двумя соседними пачками не содержится ни одного индекса первого типа, то все индексы между этими двумя пачками отнесем к группе W_2; в противном случае все индексы между этими двумя пачками отнесем к группе W_1.

Положим

$$M := \bigcup_{j \in W_1} I_j.$$

Для любого множества $X \subset \mathbb{R}$ обозначим

$$X^* := \bigcup_{j: I_j \cap X \neq 0} I_j, \quad X^{**} := (X^*)^*, \quad X^{***} := (X^{**})^*,$$

и т.д. Положим

$$\Omega := M^{***}.$$

4^o. Оценка производной на Ω.

Л е м м а 3. *Для всех $x \in \Omega$ имеет место оценка*

$$|f'(x)| \leq c_2 h^{r-1}. \tag{11}$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Зафиксируем $j \in \mathbb{Z}$ такое, что $x \in I_j$ и рассмотрим два множества

$$\overline{A}_j := \bigcup_{\nu=j}^{j+14r} I_\nu \qquad \underline{A}_j := \bigcup_{\nu=j-14r}^{j} I_\nu.$$

1. Пусть множество $\overline{A}_j$ пересекается с некоторой пачкой и множество $\underline{A}_j$ также пересекается с некоторой пачкой. Тогда по построению множества Ω среди индексов $\nu = \overline{j-14r, j+14r}$ найдется по крайней мере один индекс первого типа, который обозначим через ν^*. Согласно определению индексов первого типа для любого $y \in I_{\nu^*}$ имеем

$$|f'(y)| \leq c_1 h^{r-1}.$$

Теперь рассмотрим разделенную разность порядка $r-1$
$[t_{j_0}, \dots, t_{j_{r-2}}, x; f']$ в узлах x и $t_{j_k} \in I_{\nu^*}$, где $t_{j_k} := x_{\nu^*} + \frac{\pi k}{n(r-2)}$, $k = \overline{0, r-2}$.

Повторяя рассуждения леммы 1, получим оценку

$$|f'(x)| \leq c_2 h^{r-1},$$

т.е. в случае 1 оценка (11) доказана.

2. Пусть по крайней мере одно из множеств $\underline{A}_j$, $\overline{A}_j$ не пересекается ни с одной пачкой, скажем $\overline{A}_j$. Если по крайней мере один из индексов $j, \dots, j+14r$, составляющих множество $\overline{A}_j$, является индексом первого типа, то рассуждаем аналогично пункту 1. В противном случае рассуждаем следующим образом. По построению множества Ω среди индексов $j, \dots, j+6$ имеется по крайней мере один индекс третьего типа; среди индексов $j+7, \dots, j+13$ также имеется по крайней мере один индекс третьего типа и т.д. Другими словами, среди всех индексов $\nu = j, \dots, j+14r$ найдутся по крайней мере $r-1$ штук индексов третьего типа $\nu_1, \dots, \nu_{r-1}$ таких, что

$$8 \le |\nu_i - \nu_q| \le 14r.$$

Поэтому на множестве $\overline{A}_j$ существуют $r-1$ точек t_i, $i = \overline{1, r-1}$ таких, что

$$|f'(t_i)| \le h^{r-1}$$

и

$$6h \le |t_i - t_q| \le 14rh.$$

Рассуждая как в лемме 1, получим оценку

$$|f'(x)| \le c_2 h^{r-1}.$$

Лемма доказана.

5^o. Определение "маленькой" функции $g_1(x)$.

При всяком $j \in \mathbb{Z}$ обозначим

$$S_j(x) := \frac{1}{b} \int_{x_j}^{x} (t - x_j)^{r-2} (x_{j-1} - t)^{r-2} dt,$$

$$b := \int_{x_j}^{x_{j-1}} (t - x_j)^{r-2} (x_{j-1} - t)^{r-2} dt,$$

и заметим, что

$$S_j(x_j) = 0, \quad S_j(x_{j-1}) = 1; \tag{12}$$

$$0 \le S_j(x) \le 1, \quad x \in I_j; \tag{13}$$

$$S_j^{(q)}(x_j) = S_j^{(q)}(x_{j-1}) = 0, \quad q = \overline{1, r-2}; \tag{14}$$

$$\left| S_j^{(q)}(x) \right| \le c_3 h^{-q}, \quad q = \overline{1, r-1}, x \in I_j. \tag{15}$$

Положим

$$g_1(x) := \begin{cases} f'(x), & \text{если } x \in M^*, \\ 0, & \text{если } x \in \mathbb{R} \setminus M^{**}. \end{cases}$$

(15') На $M^{**} \setminus M^*$ определим $g_1(x)$ следующим образом. Если $I_j \subset \overline{M^{**} \setminus M^*}$ и $I_{j+2} \overline{\subset} \Omega$, то для $x \in I_j$ положим $g_1(x) := f'(x) S_j(x)$, $x \in I_j$; в противном случае (т.е. $I_{j+2} \subset \Omega$) для $x \in I_j$ положим $g_1(x) := f'(x)(1 - S_j(x))$.

Л е м м а 4. *Функция $g_1(x)$ имеет свойства*

$$g_1 \in c_4 \mathbb{W}^{r-1}. \tag{16}$$

$$\|g_1\|_{\mathbb{R}} \le c_2 h^{r-1}. \tag{17}$$

$$g_1(x)\Pi(x) \ge 0, \quad x \in \mathbb{R}. \tag{18}$$

$$(f'(x) - g_1(x))\Pi(x) \ge 0, \quad x \in \mathbb{R}. \tag{19}$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. По условию теоремы $|f^{(r)}(x)| \le 1$ почти всюду на $\mathbb{R}$; по лемме 3

$$|f'(x)| \le c_2 h^{r-1}, \quad x \in \Omega. \tag{20}$$

В силу (12) и (14) функция $g_1(x)$ имеет непрерывную $(r-2)$-ю производную, нетрудно заметить, что эта $(r-2)$-я производная также абсолютно непрерывна. Докажем оценку

$$|g_1^{(r-1)}(x)| \le c_5 \tag{21}$$

для почти всех $x \in \mathbb{R}$. Если $x \overline{\in} M^{**} \setminus M^*$, то оценка (21) очевидна. Пусть $x \in I_j \subset \overline{M^{**} \setminus M^*}$. Для доказательства (21) используем неравенство типа Колмогорова

$$\|g^{(j)}\|_{[a,b]} \le {}_6 \left((b-a)^{r-j}\|g^{(r)}\|_{[a,b]} + (b-a)^{-j}\|g\|_{[a,b]}\right), \quad j = \overline{0,r}.$$

которое для функции $g(x) = f'(x)$ и $[a,b] = I_j$ принимает вид

$$\|f^{(j+1)}\|_{I_j} \le c_6 h^{r-j-1}\|f^{(r)}\|_{I_j} + c_6 h^{-j}\|f'\|_{I_j} \le c_7 h^{r-j-1}. \tag{22}$$

Рассмотрим

$$(f'(x)S_j(x))^{(r-1)} = f^{(r)}(x)S_j(x) + \binom{r-1}{1} f^{(r-1)}(x)S_j'(x) + \dots$$
$$\dots + f'(x)S_j^{(r-1)}(x).$$

Пользуясь (15) и (22) получаем

$$\left|(f'(x)S_j(x))^{(r-1)}\right| \le c_8 2^{r-1}. \tag{23}$$

Т.е. оценка (21) доказана, а значит доказано соотношение (16). Оценка (17) следует из (11) и очевидной оценки

$$|g_1(x)| \le |f'(x)|, \quad x \in \Omega.$$

Из этой же оценки следует неравенство (19).

Неравенство (18) очевидно, когда $x \overline{\in} M^{**} \setminus M^*$, если же $x \in \overline{M^{**} \setminus M^*}$, то (18) следует из (13).

Лемма доказана.

Обозначим

$$G_1(x) := f(0) + \int\limits_0^x g_1(u)du$$

и заметим, что

$$G_1(x) = Bx + \tilde{G}_1(x), \tag{24}$$

где $B = const$, $\tilde{G}_1 - 2\pi$ - периодическая функция.

6^o. Приближение "ступеньки".

Обозначим

$$J_{l,n}(t) := \frac{1}{\gamma_{l,n}} \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^{2l}, \ l \in \mathbb{N},$$

– ядро типа Джексона, в котором

$$\gamma_{l,n} := \int\limits_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^{2l} dt.$$

Ядра типа Джексона обладают следующими свойствами ([22], см. также например [23, с. 130]):

$$\int\limits_{-\pi}^{\pi} J_{l,n}(t)dt = 1, \tag{25}$$

$$J_{l,n} \in \mathbb{T}_{l(n-1)}, \tag{26}$$

$$\frac{1}{C_9} n^{2l-1} < \gamma_{l,n} < C_{10} n^{2l-1}; \tag{27}$$

при любом $\delta \geq 0$ и $\nu = \overline{0, 2l-2}$

$$\int\limits_{\delta}^{\pi} (1+nt)^{\nu} J_{l,n}(t)dt \leq \frac{C_{11}}{(1+n\delta)^{2l-\nu-1}}, \tag{28}$$

в частности

$$\int\limits_{-\pi}^{\pi} (1+n|t|)^{\nu} J_{l,n}(t)dt \leq C_{12}. \tag{29}$$

О п р е д е л е н и е 2. Для каждой точки $x^* \overline{\in} Y$ обозначим

$$T_{l,n}(x; x^*; s; Y) := \frac{1}{d_{l,n}(x^*; s; Y)} \int\limits_{x^*-\pi}^{x} J_{l,n}(t - x^*) \frac{\Pi(t)}{\Pi(x^*)} dt, \tag{30}$$

где

$$d_{l,n}(x^*; s; Y) := \int\limits_{x^*-\pi}^{x^*+\pi} J_{l,n}(t - x^*) \frac{\Pi(t)}{\Pi(x^*)} dt.$$

Положим

$$\chi(x;x^*) := \begin{cases} 0, \text{ если } & x \le x^*, \\ 1, \text{ если } & x > x^*; \end{cases}$$

(31)

$$\delta_n(x;x^*) := \min\left\{1, \frac{1}{n|\sin\frac{x-x^*}{2}|}\right\}.$$

Л е м м а 5. *Если* $l > s$ *и*

$$\min_{i\in\mathbb{Z}} |x^* - y_i| \ge 2sC_{12}\frac{\pi}{n}, \tag{32}$$

то для функции $T(x) = T_{l,n}(x;x^*;s;Y)$ *имеют место соотношения*

$$\frac{1}{2} < d_{l,n}(x^*;s;Y) < \frac{3}{2}, \tag{33}$$

$$T(x) = \frac{1}{2\pi}x + \tilde{T}(x), \tag{34}$$

где

$$\tilde{T} \in \mathbb{T}_{l(n-1)+s}, \tag{34'}$$

$$\Pi(x^*)T'(x)\Pi(x) \ge 0, \quad x \in \mathbb{R}, \tag{35}$$

$$|T'(x)| \le C_{13}n\delta_n^{2(l-s)}(x;x^*), \quad x \in \mathbb{R}, \tag{36}$$

$$|T'(x)| \ge \frac{1}{C_{14}}n\delta_n^{2l}(x;x^*)\left|\frac{\Pi(x)}{\Pi(x^*)}\right|, \tag{37}$$

$$x \in \bigcup_{\nu\in\mathbb{Z}}[x^* + \frac{2\pi\nu}{n} + \frac{\pi}{2n}, x^* + \frac{2\pi\nu}{n} + \frac{2\pi}{n} - \frac{\pi}{2n}];$$

$$|\chi(x;x^*) - T(x)| \le C_{15}\delta_n^{2(l-s)-1}(x,x^*), \quad |x - x^*| \le 2\pi. \tag{38}$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Представим $d = d_{l,n}(x^*;s;Y)$ в виде

$$d = \int_{-\pi}^{\pi} J_{l,n}(t)\frac{\Pi(x^*+t)}{\Pi(x^*)}dt.$$

Заметим, что

$$|\Pi'(\theta)| = \frac{1}{2}\left|\sum_{i=1}^{2s}\cos\frac{\theta - y_i}{2}\prod_{\nu=1,\nu\ne i}^{2s}\sin\frac{\theta - y_\nu}{2}\right| =$$

$$= \frac{1}{2}\left|\sum_{i=1}^{2s}\cos\frac{\theta - y_i}{2}\prod_{\nu=1,\nu\ne i}^{2s}\left(\sin\frac{\theta - x^*}{2}\cos\frac{x^* - y_\nu}{2} + \cos\frac{\theta - x^*}{2}\sin\frac{x^* - y_\nu}{2}\right)\right|$$

$$\le \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2s}\prod_{\nu=1,\nu\ne i}^{2s}\left(\frac{|\theta - x^*|}{2} + \left|\sin\frac{x^* - y_\nu}{2}\right|\right), \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

Поэтому для некоторого θ, лежащего между точками x^* и x^*+t , имеем

$$\left|1-\frac{\Pi(x^*+t)}{\Pi(x^*)}\right| = \left|\frac{\Pi(x^*+t)-\Pi(x^*)}{\Pi(x^*)}\right| =$$
$$= \left|\frac{t\Pi'(\theta)}{\Pi(x^*)}\right| \le \frac{|t|}{2}\sum_{i=1}^{2s}\frac{1}{|\sin\frac{x^*-y_i}{2}|}\prod_{\nu=1,\nu\neq i}^{2s}\left(\frac{|\theta-x^*|}{2|\sin(\frac{x^*-y_\nu}{2})|}+1\right),$$

поскольку $|\theta-x^*|<t$, а в силу (32)

$$\left|\sin\frac{x^*-y_i}{2}\right| > \frac{2sC_{12}}{n} =: \frac{C_{16}}{n},$$

то

$$\left|1-\frac{\Pi(x^*+t)}{\Pi(x^*)}\right| \le |t|\frac{n}{C_{16}}s\left(1+\frac{n|t|}{2C_{16}}\right)^{2s-1} <$$
$$< \frac{s}{C_{16}}(1+n|t|)^{2s}.$$

Следовательно, с учетом (25) и (29) получаем

$$|d-1| = \left|\int_{-\pi}^{\pi} J_{l,n}(t)\left(\frac{\Pi(x^*+t)}{\Pi(x^*)}-1\right)dt\right| <$$
$$< \frac{s}{C_{16}}\int_{-\pi}^{\pi} J_{l,n}(t)(1+n|t|)^{2s}dt \le \frac{s}{C_{16}}C_{12} = 1/2.$$

Таким образом оценка (33) доказана. Соотношения (34) и (35) очевидны.
Докажем оценку (36). Очевидно

$$T'(x) = \frac{1}{d}J_{l,n}(x-x^*)\frac{\Pi(x)}{\Pi(x^*)}. \tag{39}$$

В силу определения ядра Джексона имеем

$$J_{l,n}(t) \le \frac{1}{\gamma_{l,n}}\left(\min\left\{n, \frac{1}{|\sin\frac{t}{2}|}\right\}\right)^{2l} =$$
$$= \frac{n^{2l}}{\gamma_{l,n}}\left(\min\left\{1, \frac{1}{n|\sin\frac{t}{2}|}\right\}\right)^{2l}, \quad t\in\mathbb{R},$$

т.е. согласно (27)

$$J_{l,n}(x-x^*) \le C_{10}n\delta_n^{2l}(x;x^*). \tag{40}$$

Теперь, с учетом (32) и равенства $2sC_{12}=C_{16}$,

$$\left|\frac{\sin\frac{x-y_i}{2}}{\sin\frac{x^*-y_i}{2}}\right| = \left|\frac{\sin\frac{x-x^*}{2}\cos\frac{x^*-y_i}{2}+\cos\frac{x-x^*}{2}\sin\frac{x^*-y_i}{2}}{\sin\frac{x^*-y_i}{2}}\right| \le$$
$$\le 1+\left|\frac{\sin\frac{x-x^*}{2}}{\sin\frac{x^*-y_i}{2}}\right| \le 1+\frac{n|\sin\frac{x-x^*}{2}|}{C_{16}} \le 2\delta_n^{-1}(x,x^*),$$

а значит

$$|T'(x)| \le 2^{2s+1} C_{10} n \delta_n^{2l-2s}(x;x^*) =: C_{13} n \delta_n^{2(l-s)}(x;x^*).$$

Оценка (36) доказана.

Докажем оценку (37). При

$$x \in \bigcup_{\nu\in\mathbb{Z}} \left[x^* + \frac{2\pi\nu}{n} + \frac{\pi}{2n}, x^* + \frac{2\pi\nu}{n} + \frac{2\pi}{n} - \frac{\pi}{2n} \right]$$

имеем

$$\left| \sin \frac{n(x-x^*)}{2} \right| \ge \frac{\sqrt{2}}{2},$$

откуда

$$|T'(x)| \ge \frac{2^{-l}}{d\gamma_{l,n}} \left(\frac{1}{|\sin \frac{x-x^*}{2}|} \right)^{2l} \left| \frac{\Pi(x)}{\Pi(x^*)} \right| \ge$$

$$\ge \frac{n\delta_n^{2l}(x;x^*)}{C_{14}} \left| \frac{\Pi(x)}{\Pi(x^*)} \right|.$$

Докажем оценку (38). Пусть сначала $x^* - \pi \le x < x^* - \frac{\pi}{n}$, тогда

$$\delta_n(x;x^*) = \left| \frac{1}{n \sin \frac{x-x^*}{2}} \right|;$$

в силу (31), (30) и (36)

$$|\chi(x;x^*) - T(x)| = |T(x)| = \left| \int\limits_{x^*-\pi}^{x} T'(u)du \right| \le$$

$$\le C_{13} n \int\limits_{x^*-\pi}^{x} \delta_n^{2(l-s)}(u;x^*)du = C_{13} n \int\limits_{x^*-\pi}^{x} \left(\frac{1}{n \sin \frac{u-x^*}{2}} \right)^{2(l-s)} du \le$$

$$\le \frac{C_{13}\pi^{2(l-s)}}{n^{2(l-s)-1}} \int\limits_{x^*-\pi}^{x} \frac{du}{(u-x^*)^{2(l-s)}} \le$$

$$\le \frac{C_{13}\pi^{2(l-s)}}{n^{2(l-s)-1}} \int\limits_{-\infty}^{x} \frac{du}{(u-x^*)^{2(l-s)}} =$$

$$= \frac{C_{13}\pi^{2(l-s)}}{(2(l-s)-1)n^{2(l-s)-1}} \left(\frac{1}{(x^*-x)^{2(l-s)-1}} \right) \le$$

$$\le \frac{2C_{13}(\pi/2)^{2(l-s)}}{(2(l-s)-1)n^{2(l-s)-1}} |\sin^{1-2(l-s)} \frac{(x^*-x)}{2}| =$$

$$= \frac{2C_{13}(\pi/2)^{2(l-s)}}{2(l-s)-1} \delta_n^{2(l-s)-1}(x;x^*) = C_{19}\delta_n^{2(l-s)-1}(x;x^*).$$

Пусть $x^* - \frac{\pi}{n} \le x \le x^* + \frac{\pi}{n}$. Тогда

$$\frac{2}{\pi} \le \delta_n(x;x^*) \le 1.$$

Поэтому с учётом (36)

$$|\chi(x;x^*)-T(x)|\le 1+|T(x)|=1+\left|\int\limits_{x^*-\pi}^{x}T'(u)du\right|\le$$

$$\le 1+\left|\int\limits_{x^*-\pi}^{x^*-\frac{\pi}{n}}T'(u)du\right|+\left|\int\limits_{x^*-\frac{\pi}{n}}^{x}T'(u)du\right|\le$$

$$\le 1+C_{19}\delta_n^{2(l-s)-1}(x;x^*-\frac{\pi}{n})+\frac{2\pi C_{13}n}{n}\le 1+C_{19}+2\pi C_{13}=:$$

$$=:C_{15}\left(\frac{2}{\pi}\right)^{2(l-s)-1}\le C_{15}\delta_n^{2(l-s)-1}(x;x^*).$$

В случае $x^*+\frac{\pi}{n}\le x\le x^*+\pi$ рассуждаем так же, как и в случае $x^*-\pi\le x\le x^*-\frac{\pi}{n}$, поскольку

$$\chi(x;x^*)-T(x)=1-T(x)=1-\int\limits_{x^*-\pi}^{x}T'(u)du=$$

$$=1-\int\limits_{x^*-\pi}^{x^*+\pi}T'(u)du+\int\limits_{x}^{x^*+\pi}T'(u)du=$$

$$=\int\limits_{x}^{x^*+\pi}T'(u)du.$$

В случае $x^*-2\pi\le x\le x^*-\pi$ имеем

$$T(x)-\chi(x;x^*)=T(x)=\frac{1}{2\pi}x+\tilde{T}(x)=$$

$$=-1+\frac{1}{2\pi}(x+2\pi)+\tilde{T}(x+2\pi)=T(x+2\pi)-\chi(x+2\pi;x^*).$$

Поскольку $x^*\le x+2\pi\le x^*+\pi$, то пользуясь предыдущими двумя случаями, получаем оценку (38).

Наконец, в случае $x^*+\pi\le x\le x^*+2\pi$ рассуждая аналогично предыдущему случаю, получаем

$$|T(x)-\chi(x;x^*)|=|T(x)-1|=\left|\frac{1}{2\pi}x+\tilde{T}(x)-1\right|=$$

$$=\left|\frac{1}{2\pi}(x-2\pi)+\tilde{T}(x-2\pi)\right|=|T(x-2\pi)|=$$

$$=|T(x-2\pi)-\chi(x-2\pi;x^*)|\le C_{15}\delta_n^{2(l-s)-1}(x;x^*).$$

Лемма доказана.

7^o. Множество O.

Положим $O_i := (x_{j+1}, x_{j-2})$, если $y_i \in [x_j, x_{j-1})$;

$$O := \bigcup_{i\in\mathbb{Z}} O_i. \tag{41}$$

Будем писать $j \in H_*$, если $I_j \overline{\in} O$; $j \in H$, если $j \in H_*$, $|j| \le n$ и $j \ne -n$. Обозначим

$$\mathbb{I} := [-\pi, \pi].$$

8^o. "Поправляющие" функции.

В этом пункте введем "поправляющие" функции $T_j(x)$ и $\overline{T}_j(x)$, первая из которых будет использована в следующем пункте, а вторая – в пункте 12^o.

Положим

$$x_j^* := \frac{x_{j-1} + x_j}{2},$$
$$c_{12} := \max\{C_{12,s+2}, C_{12,s+3}\},$$
$$n_1 := 4(s+1)c_{12}n;$$
$$x_j^{**} := x_j^* + \frac{\pi}{n_1},$$
$$\chi_j(x) := \chi_j(x, x_j).$$

Для каждого $j \in H$ обозначим

$$T_j(x) := \frac{1}{2}(T_{s+2,n_1}(x; x_j^*; s; Y) + T_{s+2,n_1}(x; x_j^{**}; s; Y)); \tag{42}$$

$$\Pi_j(x) := \sin\left(\frac{x - x_j}{2}\right)\sin\left(\frac{x - x_{j-1}}{2}\right)\Pi(x),$$
$$Y_j := Y \cup \{x_j\} \cup \{x_{j-1}\};$$
$$T_j^*(x) := T_{s+3,n_1}(x; x_j^*; s+1; Y_j)$$

(т.е.

$$T_j^*(x) := \frac{1}{d_{n_1}(x_j^*; s+1; Y_j)} \int\limits_{x_j^*-\pi}^{x} J_{s+3,n_1}(x_j^* - t)\frac{\Pi_j(t)}{\Pi_j(x_j^*)}dt);$$

$$\overline{T}_j(x) := (T_j(x) - T_j^*(x))sign\Pi(x_j). \tag{43}$$

Л е м м а 6. *Для каждого $j \in H$ функции $T_j(x)$, $\overline{T}_j(x)$ имеют свойства*

$$T_j(x) = \frac{1}{2\pi}x \ + \ \tilde{T}_j(x), \tag{44}$$

где $\tilde{T}_j \in \mathbb{T}_{(n_1-1)(s+2)+s}$;

$$\Pi(x_j^*)T_j'(x)\Pi(x) \ge 0, \quad x \in \mathbb{R}, \tag{45}$$

$$|T_j'(x)| \ge c_{20}n_1\delta_{n_1}^{2(s+2)}(x; x_j^*)\left|\frac{\Pi(x)}{\Pi(x_j^*)}\right|, \quad x \in \mathbb{R}, \tag{46}$$

$$|T_j'(x)| \ge c_{21}n_1\delta_{n_1}^{4(s+1)}(x; x_j^*), \quad x \in \mathbb{R} \setminus O, \tag{47}$$

$$\sum_{j\in H}|T_j(x)-\chi_j(x)|\le c_{22},\quad x\in I, \tag{48}$$

$$\overline{T}_j\in\mathbb{T}_{(n_1-1)(s+3)+s+1}, \tag{49}$$

$$|\overline{T}_j'(x)|\le c_{23}n,\quad x\in I_j, \tag{50}$$

$$\overline{T}_j'(x)\Pi(x)\ge 0,\quad x\in I\setminus I_j, \tag{51}$$

$$|\overline{T}_j'(x)|\ge|T_j'(x)|\ge c_{24}n\delta_{n_1}^{2(s+2)}(x;x_j^*)\left|\frac{\Pi(x)}{\Pi(x_j^*)}\right|,\quad x\in I_j\setminus I_j, \tag{52}$$

$$|\overline{T}_j'(x)|\ge c_{25}n_1\delta_{n_1}^{4(s+1)}(x;x_j^*),\quad x\in I\setminus(O\cup I_j), \tag{53}$$

$$\sum_{j\in H}|\overline{T}_j(x)|\le c_{26},\quad x\in I. \tag{54}$$

Доказательство. Поскольку $j\in H$, то

$$\min_{i\in\mathbb{Z}}|x_j^*-y_i|>|x_j-x_j^*|=|x_{j-1}-x_j^*|=\frac{\pi}{2n}=\frac{\pi 4(s+1)c_{12}}{2n_1}=$$
$$=2(s+1)c_{12}\frac{\pi}{n_1}>2sc_{12}\frac{\pi}{n_1},$$
$$\min_{i\in\mathbb{Z}}|x_j^{**}-y_i|>2sc_{12}\frac{\pi}{n_1}.$$

Поэтому все соотношения леммы 6, кроме (47),(48), (53) и (54) следуют из леммы 5. Неравенство (47) немедленно вытекает из (46), поскольку для всех y_i и $x\in\mathbb{R}\setminus O$

$$\delta_n(x;x_j^*)\le 2\left|\frac{\sin\frac{x-y_i}{2}}{\sin\frac{x_j^*-y_i}{2}}\right|.$$

По этой же причине неравенство (53) следует из (52).

Так что докажем (48), а затем (54).

Представим разность

$$\alpha_j(x):=\chi(x;x_j^*)-T_j(x)$$

в виде

$$\alpha_j(x)=\frac{1}{2}(\chi(x;x_j^*)-T_{s+2,n_1}(x;x_j^*;s;Y))+\frac{1}{2}(\chi(x;x_j^{**})-$$
$$-T_{s+2,n_1}(x;x_j^{**};s;Y))+\frac{1}{2}(\chi(x;x_j^*)-\chi(x;x_j^{**})).$$

Тогда в силу (38) и оценки

$$\frac{1}{4}\delta_{n_1}(x;x_j^*)\le\delta_{n_1}(x;x_j^{**})\le 4\delta_{n_1}(x;x_j^*),$$

имеем

$$|\alpha_j(x)|\le\frac{1}{2}c_{15}\delta_{n_1}^3(x;x_j^*)+\frac{64}{2}c_{15}\delta_{n_1}^3(x;x_j^{**})+\frac{1}{2}|\chi(x;x_j^*)-\chi(x;x_j^{**})|=$$
$$=\frac{65}{2}c_{15}\delta_{n_1}^3(x;x_j^*)+\frac{1}{2}|\chi(x;x_j^*)-\chi(x;x_j^{**})|\le$$
$$\le\frac{65}{2}c_{15}\delta_{n_1}^3(x;x_j^*)+\frac{1}{2}\delta_n^3(x;x_j^*)\le c_{27}\delta_{n_1}^2(x;x_j^*),$$

где $c_{15} = \max\{C_{15,s+2}, C_{15,s+3}\}$.

Поэтому

$$\sum_{j\in H} |T_j(x) - \chi_j(x)| \le c_{27} \sum_{j=-n+1}^{n} \delta_{n_1}^2(x; x_j^*) =: c_{27} \sum .$$

Оценим $\sum$. Пусть $x \in I_\nu$. Если $|x - x_j^*| < \pi$ и $j \neq \nu$, то

$$\delta_{n_1}(x; x_j^*) \le \frac{1}{n_1 |\sin(\frac{x-x_j^*}{2})|} \le \frac{\pi}{n_1 |x - x_j^*|} < \frac{1}{|j-\nu|};$$

если $\pi \le |x - x_j^*| < 2\pi$, то воспользуемся равенствами

$$\left|\sin\frac{x-x_j^*}{2}\right| = \left|\sin\frac{x-x_j^*}{2} + \pi\right| = \left|\sin\frac{x-(x_j^*-2\pi)}{2}\right| = \left|\sin\frac{x-x_{j+2s}^*}{2}\right|,$$

и дело сводится к предыдущему случаю. Поэтому учитывая равенство

$$\delta_{n_1}(x; x_j^*) = \delta_{n_1}(x; x_{j\pm 2n}^*)$$

получим

$$\sum = \sum_{j=-n+1}^{n} \delta_{n_1}^2(x; x_j^*) = \sum_{j=-n+1+\nu}^{n+\nu} \delta_{n_1}^2(x; x_j^*) =$$

$$= \delta_{n_1}^2(x; x_\nu^*) + \delta_{n_1}^2(x; x_{n+\nu}^*) + \delta_{n_1}^2(x; x_{-n+1+\nu}^*) + \sum_{j=-n+2+\nu}^{n+\nu-1} \delta_{n_1}^2(x; x_j^*) <$$

$$< 3 + \sum_{j=-n+2+\nu, j\neq\nu}^{n+\nu-1} \frac{1}{(j-\nu)^2} < 3 + 2\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} = 3 + \frac{\pi^2}{3}.$$

Так что (48) доказано с $c_{22} = c_{27}(3 + \frac{\pi^2}{3})$

Докажем (54). Представим $\overline{T}_j(x)$ в виде

$$\overline{T}_j(x) sign \Pi(x_j) = -\alpha_j(x) + \chi(x; x_j^*) - T_j^*(x).$$

В силу (38) имеем

$$|\overline{T}_j(x)| \le c_{27}\delta_{n_1}^2(x; x_j^*) + c_{15}\delta_{n_1}^2(x; x_j^*) = (c_{27} + c_{15})\delta_{n_1}^2(x; x_j^*).$$

Поэтому

$$\sum_{j\in H} |\overline{T}_j(x)| \le (c_{27} + c_{15}) \sum_{j=-n+1}^{n} \delta_{n_1}(x; x_j^*) \le c_{26}.$$

Лемма доказана.

З а м е ч а н и е 2. Поскольку

$$\delta_{n_1}(x; x_j^*) > c_{27'} \frac{1}{1 + n\, dist\,(x, I_j)},$$

то (53) влечёт

$$|\overline{T}'_j(x)| \geq c'_{25} n \left(\frac{1}{1 + n\, dist\,(x, I_j)} \right)^{4(s+1)}, \quad x \in I \setminus (O \cup I_j) \tag{53'}$$

9^o. Приближение функции $G_1(x)$.

О п р е д е л е н и е 3. Через $N := N(Y) > 0$ обозначим число, имеющее следующее свойство : существуют две точки x^* и x_* такие, что $\Pi(x) \geq 0$ при $x \in [x^* - \frac{\pi}{N}, x^* + \frac{\pi}{N}]$, $\Pi(x) \leq 0$ при $x \in [x_* - \frac{\pi}{N}, x_* + \frac{\pi}{N}]$.

Л е м м а 7. *Пусть непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}$ функция G имеет вид*

$$G(x) = Ax + \tilde{G}(x),$$

где $A = const$, $\tilde{G}$ - периодическая функция. Если

$$G'(x)\Pi(x) \geq 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

и

$$\|G'\| \leq 1,$$

то при $n > N$ функция

$$V_n(x; G) := G(-\pi) + \sum_{j \in H} (G(x_{j-1}) - G(x_j)) T_j(x) +$$

$$+ \sum_{j=-n+1, j\overline{\in} H}^{n} (G(x_{j-1} - G(x_j))(\delta_j T_{s+2,n_1}(x; x^*; s; Y) +$$

$$+ (1 - \delta_j) T_{s+2,n_1}(x; x^*; s; Y)),$$

в которой

$$\delta_j := \begin{cases} 1, & \text{если} \quad G(x_{j-1}) - G(x_j) \geq 0, \\ 0, & \text{если} \quad G(x_{j-1}) - G(x_j) < 0; \end{cases}$$

имеет свойства

$$V_n(x; G) = Ax + \tilde{V}_n(x; G), \tag{55}$$

где $\tilde{V}_n \in \mathbb{T}_{(s+2)(n_1-1)+s}$;

$$V'_n(x; G)\Pi(x) \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}; \tag{56}$$

$$\|G - V_n\| \leq \frac{c_{28}\pi}{n}. \tag{57}$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Согласно (44) и (34)

$$V_n(x; G) = G(-\pi) + \sum_{j \in H} (G(x_{j-1}) - G(x_j)) \left(\frac{x}{2\pi} + \tilde{T}_j(x) \right) +$$

$$+ \sum_{j=-n+1, j\overline{\in} H}^{n} (G(x_{j-1} - G(x_j)) \left(\frac{x}{2\pi} + \right.$$

$$\left. + \delta_j \tilde{T}_{s+2,n_1}(x; x^*; s; Y) + (1 - \delta_j) \tilde{T}_{s+2,n_1}(x; x_*; s; Y) \right) =:$$

$$=: \frac{x}{2\pi} \sum_{j=-n+1}^{n} (G(x_{j-1}) - G(x_j)) + \tilde{V}_n(x; G) =$$

$$= \frac{x}{2\pi}(G(\pi) - G(-\pi)) + \tilde{V}_n(x; G) = Ax + \tilde{V}_n(x; G);$$

т.е. (55) верно с учетом (34′).

Далее, если $j \in H$, то очевидно

$$sign(G(x_{j-1}) - G(x_j)) = sign\Pi(x_j^*),$$

поэтому с учетом (45)

$$sign\left((G(x_{j-1}) - G(x_j))T_j'(x)\Pi(x)\right) = sign(\Pi(x_j^*)T_j'(x)\Pi(x)) \geq 0;$$

если $j\overline{\in}H$ и $sign(G(x_{j-1}) - G(x_j)) > 0$, то с учетом (35)

$$sign\left((G(x_{j-1}) - G(x_j))\delta_j T'_{s+2,n_1}(x; x^*; s; Y)\Pi(x)\right) = sign\Pi(x^*) \geq 0.$$

Если $j\overline{\in}H$ и разность $G(x_{j-1}) - G(x_j) \leq 0$, то

$$sign\left((G(x_{j-1}) - G(x_j))(1-\delta_j)T_{s+2,n_1}(x; x_*; s; Y)\Pi(x)\right) = \\ = -sign\Pi(x_*) \geq 0,$$

т.е. неравенство (56) тоже верно. Осталось доказать оценку (57). Для этого рассмотрим функцию

$$S_n(x; G) = G(-\pi) + \sum_{j=-n+1}^{n} (G(x_{j-1}) - G(x_j))\chi_j(x).$$

Если $x \in (x_\nu, x_{\nu-1}]$, $\nu = \overline{-n+1, n}$, то

$$G(x) - S_n(x; G) = G(x) - G(x_\nu) = \int_{x_\nu}^{x} G'(t)dt,$$

т.е.

$$\|G - S_n\| \leq \frac{\pi}{n},$$

очевидно

$$|G(x_{j-1}) - G(x_j)| \leq \frac{\pi}{n},$$

Поэтому в силу (48)

$$\left|\sum_{j\in H}(G(x_{j-1}) - G(x_j))(T_j(x) - \chi_j(x))\right| \leq \frac{c_{22}\pi}{n}.$$

Теперь заметим, что количество индексов j таких, что $j\overline{\in}H$ и $j = \overline{-n+1, n}$, не превосходит $6s$, тогда

$$\left|\sum_{j=\overline{-n+1,n}, j\overline{\in}H} (G(x_{j-1}) - G(x_j))\chi_j(x)\right| \leq \frac{6s\pi}{n},$$

аналогично с учётом (38)

$$|\sum_{j=\overline{-n+1,n},j\overline{\in}H}(G(x_{j-1})-G(x_j))(\delta_j T_{s+2,n_1}(x;x^*;s;Y)+$$
$$+(1-\delta_j)T_{s+2,n_1}(x;x_*;s;Y))|\le$$
$$\le(|T_{s+2,n_1}(x;x^*;s;Y)|+|T_{s+2,n_1}(x;x_*;s;Y))|)\,\frac{6s\pi}{n}\le$$
$$\le(|T_{s+2,n_1}(x;x^*;s;Y)-\chi(x;x^*)|+|\chi(x;x^*)|+$$
$$+|T_{s+2,n_1}(x;x_*;s;Y)-\chi(x;x_*)|+|\chi(x;x_*)|)\frac{6s\pi}{n}\le$$
$$\le(2+2c_{15})\frac{6s\pi}{n}.$$

Таким образом находим

$$\|G-V_n\|=\|(G-S_n)+\sum_{j\in H}(G(x_{j-1})-G(x_j))(\chi_j-T_j)+$$
$$+\sum_{j=\overline{-n+1,n},j\overline{\in}H}(G(x_{j-1})-G(x_j))\chi_j-$$
$$-\sum_{j=\overline{-n+1,n},j\overline{\in}H}(G(x_{j-1})-G(x_j))(\delta_j T_{s+2,n_1}(\ .\ ;x^*)+$$
$$+(1-\delta_j)T_{s+2,n_1}(\ .\ ;x_*))\|\le\frac{\pi}{n}+\frac{c_{22}\pi}{n}+$$
$$+\frac{6s\pi}{n}+\frac{6s\pi}{n}(2+2c_{15}).$$

Лемма доказана.

Следствием леммы 7 и соотношений (24), (17) является

Л е м м а 8. *При каждом $n>N$ существует полином $\tilde{V}_n(x;G_1)$ такой, что*

$$\tilde{V}_n\in\mathbb{T}_{(s+2)(n_1-1)+s} \tag{55'}$$

$$(B+\tilde{V}_n'(x;G_1))\Pi(x)\ge 0 \tag{56'}$$

$$\|\tilde{G}_1-\tilde{V}_n\|\le\frac{c_2c_{28}\pi^r}{n^r} \tag{57'}$$

В самом деле, (55') и (56') очевидны, а (57') получается сразу, как только мы заметим, что

$$\|G_1'\|\le c_2\left(\frac{\pi}{n}\right)^{r-1}.$$

10^o. Определение функции $G_2(x)$.

Если не существует ни одной пачки (опр. пачки см. п. 3^0), то $G_1(x)=f(x)$ и справедливость доказываемой теоремы вытекает из леммы 8. Поэтому всюду далее предполагаем, что по крайней мере одна пачка существует. В частности, $G_1(x)\not\equiv f(x)$. Обозначим

$$G_2(x):=f(x)-G_1(x), \tag{58}$$

$$g_2(x) := G_2'(x).$$

Из (16), (19), (24), (15′), (8) и определения W_2 вытекают соответственно следующие свойства функции G_2:

$$G_2' \in c_{29}\mathbb{W}^{r-1}, \text{где } \ c_{29} = c_4 + 1; \tag{58′}$$

$$g_2(x)\Pi(x) \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}; \tag{58″}$$

$$G_2(x) = -Bx + \tilde{G}_2(x), \tag{59}$$

где $\tilde{G}_2$ – 2π-периодическая функция;

$$G_2'(x) = 0, \quad x \in M^*; \tag{60}$$

$$G_2'(x) = f'(x), \quad x \in \mathbb{R} \setminus M^{**}; \tag{61}$$

$$|G_2'(x)| \geq h^{r-1}, x \in I_j, \ j \in V_2 \setminus W_1. \tag{62}$$

Поскольку функция f периодическая, то без потери общности будем считать $-n+1 \in W_2 \cap V_2$ и $n \in W_2 \cap V_2$.

11^o. Приближение без ограничений функции G_2.

Обозначим

$$\Delta_t^r(G; x) = \sum_{j=0}^{r} (-1)^{r-j} \binom{r}{j} G(x + tj)$$

– r-тую разность функции G с шагом t в точке x.

Л е м м а 9. *Пусть $G \in \mathbb{W}^r$, $r > 1$, – 2π-периодическая функция ; $l > r + 2$, $E \subset \mathbb{R}$, такое, что если $y \in E$, то $(y \pm 2\pi) \in E$. Если*

$$G''(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R} \setminus E,$$

то тригонометрический полином

$$\Theta_{n,l,r}(x; G) := -(-1)^r \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{j=1}^{r} (-1)^{r-j} \binom{r}{j} G(x + j\tau) J_{l,n}(\tau) d\tau$$

порядка

$$l(n-1) \tag{63}$$

имеет свойства :

$$\|G - \Theta_{n,l,r}\| \leq c_{30} \left(\frac{\pi}{n}\right)^r; \tag{64}$$

$$|G'(x) - \Theta'_{n,l,r}(x, g)| \leq c_{31} \left(\frac{\pi}{n}\right)^{r-1} \left(\frac{1}{1 + n dist(x, E)}\right)^{2l-r}, \quad x \in \mathbb{R}, \tag{65}$$

$$\|G' - \Theta'_{n,l,r}\| \leq c_{31} \left(\frac{\pi}{n}\right)^{r-1}; \tag{66}$$

$$\|G'' - \Theta''_{n,l,r}\| \leq c_{32} \left(\frac{\pi}{n}\right)^{r-2}. \tag{67}$$

Доказательство. Доказательство леммы по сути ничем не отличается от рассуждений С.Б.Стечкина [22] (см. также [23, с. 210]). Для удобства читателя приведем эти рассуждения.

Поскольку $G \in \mathbb{W}^r$, то (см., например [7, с. 18])

$$| \triangle_t^r (x; G)| \le |t|^r, \quad x \in \mathbb{R}, \tag{68}$$

$$| \triangle_t^r (x; G')| = | \triangle_t^{r-1} (x; G') - \triangle_t^{r-1}(x + t; G')| \le 2|t|^{r-1}, \quad x \in \mathbb{R}; \tag{69}$$

$$| \triangle_t^r (x; G'')| = | \triangle_t^{r-2} (x; G'') - 2 \triangle_t^{r-2} (x - t; G'')+ \\ + \triangle_t^{r-2} (x - 2t; G'')| \le 4|t|^{r-2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. Из условий леммы следует

$$G(x) - \Theta_{n,l,r}(x; G) = \int\limits_{-\pi}^{\pi} \triangle_t^r(G; x) J_{l,n}(t)dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

В силу (68) и (29) получаем

$$\left| \int\limits_{-\pi}^{\pi} \triangle_t^r(G; x) J_{l,n}(t)dt \right| \le \int_{-\pi}^{\pi} |t|^r J_{l,n}(t)dt \le \frac{C_{12}\pi}{n^r}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Тем самым неравенство (64) доказано.

2. Аналогично пункту 1 имеем

$$\left|G'(x) - \Theta'_{n,l,r}(x; G)\right| = \left| \int\limits_{-\pi}^{\pi} \triangle_t^r(G'; x) J_{l,n}(t)dt \right|.$$

И в силу (69) и (29) получаем

$$\left| \int\limits_{-\pi}^{\pi} \triangle_t^r(G'; x) J_{l,n}(t)dt \right| \le \frac{2C_{12}}{n^{r-1}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Тем самым неравенство (66) доказано а также доказано неравенство (65) в случае $x \in E$.

3. Докажем неравенство (65) для $x \overline{\in} E$. Обозначим $d = dist\,(x; E)$. Заметим, $\triangle_t^r(x; G') = 0$ при $|t| \le \frac{d}{r}$ и разобьем разность

$$\left|G'(x) - \Theta'_{n,l,r}(x; G)\right| = \left| \int\limits_{-\pi}^{\pi} \triangle_t^r(G'; x) J_{l,n}(t)dt \right|$$

на два интеграла. Получим

$$\int\limits_{-\pi}^{\pi} \triangle_t^r(G'; x) J_{l,n}(t)dt = \int\limits_{-\pi}^{-d/r} \triangle_t^r(G'; x) J_{l,n}(t)dt + \int\limits_{d/r}^{\pi} \triangle_t^r(G'; x) J_{l,n}(t)dt.$$

Из (28) и неравенства (69) получаем оценку

$$|G'(x)-\Theta'_{n,l,r}(x;G)|\le\left|\int\limits_{-\pi}^{-d/r}\triangle_t^r(G';x)J_{l,n}(t)dt\right|+$$

$$+\left|\int\limits_{d/r}^{\pi}\triangle_t^r(G';x)J_{l,n}(t)dt\right|\le\frac{4C_{11}}{n^{r-1}(1+nd/r)^{2l-r}}\le$$

$$\le C_{31}h^{r-1}\left(\frac{1}{1+n\,dist(x,E)}\right)^{2l-r}.$$

Тем самым доказано неравенство (65) и в случае $x\overline{\in}E$.

4. Неравенство (67) доказывается аналогично пункту 1, или 2.

Лемма доказана.

12^o. Приближение функции $G_2(x)$ на $\mathbb{R}\setminus O$.

Обозначим

$$E:=\mathbb{R}\setminus M^*,\quad C_{31}:=C_{31,s+1};$$

$$c_{34}:=\max\{(4c_{29}c_{31})^{\frac{1}{r+1}},\quad\frac{5^{4(s+1)}4c_{23}c_{29}c_{31}}{c'_{25}},$$

$$\left(\frac{4c_{23}c_{29}c_{31}(1-(r-2)\pi)^{4(s+1)}}{c'_{25}}\right)^{\frac{1}{r-1}}\},\qquad(70')$$

$$n_2:=c_{34}n.$$

Л е м м а 11. *Функция*

$$R(x):=\Theta_{n_2,2(s+1)+r,r}(x;\tilde G_2)-Bx+\frac{\pi^{r-1}}{2c_{23}n^r}\sum_{j\in V_2\setminus W_1}\overline{T}_j(x)\qquad(71)$$

имеет свойства :

$$R(x)=-Bx+\tilde R(x),\qquad(72)$$

где $\tilde R\in\mathbb{T}_{(n_2-1)(2s+2+r)}$*;*

$$\|\tilde R-\tilde G_2\|\le\frac{c_{35}}{n^r};\qquad(73)$$

$$R'(x)\Pi(x)\ge0,\quad x\in\mathbb{R}\setminus O.\qquad(74)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Свойство (72) следует из (63) и (49). Неравенство (73) следует из (54), (57), (64), и представления (59). Докажем (74). Обозначим

$$\frac{\pi^{r-1}}{2c_{23}n^r}\sum_{j\in W_2\cap V_2}\overline{T}_j(x)=:L(x)\qquad(75)$$

и заметим, что в силу (51)

$$L'(x)\Pi(x)\ge0\qquad(76)$$

если $x \in I_\nu$, $\nu \overline{\in} V_2 \cap W_2$;

$$L'(x)\Pi(x) \geq \frac{\pi^{r-1}}{2c_{23}n^r}\overline{T}'_\nu(x)\Pi(x), \tag{77}$$

если $\nu \in V_2 \cap W_2$.

Без потери общности будем считать, что $x \in I = [-\pi, \pi]$. Согласно (53′) имеем оценку

$$\frac{1}{n^r}|\overline{T}'_j(x)| \geq c'_{25}\frac{1}{n^{r-1}}\left(\frac{1}{1+ndist\ (x, I_j)}\right)^{4(s+1)}, \tag{78}$$

$x \in I \setminus (O \cup I_j)$, $dist(x, I_j) \leq \pi$. Обозначим

$$\Theta(x) := \Theta_{n_2,2(s+1)+r,r}(x; \tilde{G}_2).$$

Из неравенства (65) леммы 9, (58′) и (60) имеем

$$|\tilde{G}'_2(x) - \Theta'(x)| \leq \frac{c_{29}c_{31}\pi^{r-1}}{n_2^{r-1}}\left(\frac{1}{1+n_2dist(x,E)}\right)^{4(s+1)} \leq$$
$$\leq \frac{c_{29}c_{31}\pi^{r-1}}{n_2^{r-1}}\left(\frac{1}{1+ndist(x,E)}\right)^{4(s+1)}, \quad x \in \mathbb{R},$$

(79) где, напомним, $E := \mathbb{R} \setminus M^*$.

Из неравенств (66) и (58′) имеем

$$\|\tilde{G}'_2 - \Theta'\| \leq \frac{c_{29}c_{31}\pi^{r-1}}{n_2^{r-1}}. \tag{80}$$

Производную $R'(x)$ представим в виде

$$R'(x) = \Big(\Theta'(x) - \tilde{G}'_2(x)\Big) + G'_2(x) + L'(x). \tag{81}$$

Зафиксируем индекс $\nu \in H$, точку $x \in I_\nu$ и, считая для определенности $\Pi(x) > 0$, рассмотрим три случая. В случае 1. воспользуемся оценкой

$$G'_2(x) \geq \left(\frac{\pi}{n}\right)^{r-1},$$

вытекающей из (8), (15′) и (58′), а в случаях 2. и 3. – оценкой $G'_2(x) \geq 0$.

1. Пусть $\nu \in V_2 \setminus W_1$. В силу (81), (80), (62), (58″), (77), (50) и (70′) имеем

$$R'(x) \geq -c_{29}c_{31}\left(\frac{\pi}{n_2}\right)^{r-1} + \left(\frac{\pi}{n}\right)^{r-1} - \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{n}\right)^{r-1} =$$

$$= \left(\frac{\pi}{n}\right)^{r-1}\left(\frac{1}{2} - \frac{c_{29}c_{31}}{{c_{34}}^{r+1}}\right) > 0.$$

2. Пусть теперь $\nu \in W_1$. Обозначим j – индекс ближайшего к x из отрезков I_μ таких, что $\mu \in V_2$ и $I_\mu \in \overline{I \setminus M^{**}}$.

Тогда очевидно

$$dist\,(x, I_j) = dist\,(x, E) + \frac{\pi}{n},$$

откуда

$$\frac{1}{1+ndist\,(x,I_j)} > \frac{1}{5(1+ndist\,(x,E))}. \tag{82}$$

В силу (81), (79), (76), (78) и (70′) имеем

$$R'(x) >$$
$$\frac{-c_{29}c_{31}}{n_2^{r-1}}\left(\frac{1}{1+ndist\,(x,E)}\right)^{4(s+1)} + \frac{c'_{25}\pi^{r-1}}{2c_{23}n^{r-1}}\left(\frac{1}{1+ndist\,(x,I_j)}\right)^{4(s+1)} >$$
$$> \left(\frac{\pi}{n}\right)^{r-1}\left(\frac{-c_{29}c_{31}}{c_{34}} + \left(\frac{1}{5}\right)^{4(s+1)}\frac{c'_{25}}{2c_{23}}\right)\left(\frac{1}{1+ndist\,(x,E)}\right)^{4(s+1)} > 0.$$

3. Наконец, пусть $\nu \in W_2 \setminus V_2$. Обозначим j– индекс ближайшего к x из отрезков I_μ, таких, что $\mu \in V_2$. В силу Леммы 2

$$dist(x,I_j) \le \frac{\pi(r-2)}{n}. \tag{83}$$

В силу (81), (80), (76), (78), (83) и (70′) имеем

$$R'(x) > -c_{29}c_{31}\left(\frac{\pi}{n_2}\right)^{r-1} + \frac{c'_{25}}{2c_{23}}\left(\frac{\pi}{n}\right)^{r-1}\left(\frac{1}{1+n\,dist(x,I_j)}\right)^{4(s+1)} >$$
$$> \left(\frac{\pi}{n}\right)^{r-1}\left(\frac{-c_{29}c_{31}}{c_{34}^{r-1}} + \frac{c'_{25}}{2c_{23}(1+(r-2)\pi)^{4(s+1)}}\right) > 0.$$

Лемма доказана.

13^0. Приближение функции на O.

Обозначим через $N_1 := N_1(Y)$ число такое, что при всех $n > N_1$ и любом i

$$y_{i-1} - y_i > \frac{6\pi}{n}. \tag{84}$$

Зафиксируем точку $y_i \in \mathbb{I}$. Пусть $y_i \in [x_j, x_{j-1})$. Положим

$$\overline{Y}_i := Y \setminus \{y_i\} \cup \{x_{j+1}\}, \quad \underline{Y}_i := Y \setminus \{y_i\} \cup \{x_{j-2}\}; \tag{85}$$

$$\overline{\Pi}_i(x) := \sin\frac{(x-x_{j+1})}{2}\prod_{\nu=0,\nu\neq i}^{2s-1}\sin\frac{(x-y_i)}{2}, \tag{86}$$

$$\underline{\Pi}_i(x) := \sin\frac{(x-x_{j-2})}{2}\prod_{\nu=0,\nu\neq i}^{2s-1}\sin\frac{(x-y_i)}{2}; \tag{87}$$

$$\overline{P}_i(x) := \frac{1}{2}(T_{s+2,n_1}(x;x^*_{j-2},s,\overline{Y}_i) + T_{s+2,n_1}(x;x^{**}_{j-2},s,\overline{Y}_i)), \tag{88}$$

$$\underline{P}_i(x) := \frac{1}{2}(T_{s+2,n_1}(x;x^*_{j+2},s,\underline{Y}_i) + T_{s+2,n_1}(x;x^{**}_{j+2},s,\underline{Y}_i)); \tag{89}$$

$$\overline{K}_i(x) := (T_{j+2}(x) - \overline{P}_i(x))sign\Pi(x^*_{j+2}), \tag{90}$$

$$\underline{K}_i(x) := (T_{j-2}(x) - \underline{P}_i(x))sign\Pi(x^*_{j-2}); \tag{91}$$

$$U_i(x) := \frac{1}{n^r}(T_{j+2}(x) - T_{j-2}(x))sign\Pi(x^*_{j+2}). \tag{92}$$

Из (44) и (34) следует

$$\overline{K}_i, \underline{K}_i, U_i \in \mathbb{T}_{(s+2)(n_1-1)+s}. \tag{93}$$

Из (45) и (35) для $x \in \mathbb{I} \setminus O_i$ следует

$$\begin{gathered}\overline{K}'_i(x)sign\,\Pi(x) = T'_{j+2}(x)sign\Pi(x)sign\Pi(x_{j+2}) - \\ -\overline{P}'_i(x)sign\Pi(x)sign\Pi(x_{j+2}) = \\ = T'_{j+2}(x)sign\Pi(x)sign\Pi(x_{j+2}) + \overline{P}'_i(x)sign\overline{\Pi}_i(x)sign\overline{\Pi}(x_{j-2}) \geq 0,\end{gathered} \tag{94}$$

$$\begin{gathered}\underline{K}'_i(x)sign\,\Pi(x) = T'_{j-2}sign\Pi(x)sign\Pi(x_{j-2}) - \\ -\underline{P}'_i(x)sign\Pi(x)sign\Pi(x_{j-2}) = \\ = T'_{j-2}(x)sign\Pi(x)sign\Pi(x_{j-2}) + \underline{P}'_i(x)sign\underline{\Pi}_i(x)sign\underline{\Pi}(x_{j+2}) \geq 0,\end{gathered} \tag{95}$$

$$\begin{gathered}\overline{K}'_i(y_i) = -\overline{P}'_i(y_i)sign\Pi(x^*_{j+2}) = \overline{P}'_i(y_i)sign\overline{\Pi}_i(x_{j-2}) = \\ = \left(\overline{P}'_i(y_i)sign\overline{\Pi}_i(x_{j-2})sign\overline{\Pi}_i(y_i)\right) sign\overline{\Pi}_i(y_i) = \\ = \left|\overline{P}'_i(y_i)\right| sign\overline{\Pi}_i(y_i) = \left|\overline{P}'_i(y_i)\right| sign\Pi(x_{j-2}).\end{gathered} \tag{96}$$

$$\begin{gathered}\underline{K}'_i(y_i) = -\underline{P}'_i(y_i)sign\Pi(x^*_{j-2}) = \underline{P}'_i(y_i)sign\underline{\Pi}_i(x_{j+2}) = \\ = (\underline{P}'_i(y_i)sign\underline{\Pi}_i(x_{j+2})sign\underline{\Pi}_i(y_i))\, sign\underline{\Pi}_i(y_i) = \\ = |\underline{P}'_i(y_i)|\, sign\underline{\Pi}_i(y_i) = |\underline{P}'_i(y_i)|\, sign\Pi(x_{j+2}).\end{gathered} \tag{97}$$

В силу (37)

$$\begin{gathered}\left|\overline{P}'_i(y_i)\right| \geq \frac{n}{2C_{14,s+2}}\left(\delta_n^{2(s+2)}(y_i; x^*_{j-2})\left|\frac{\overline{\Pi}_i(y_i)}{\overline{\Pi}_i(x^*_{j-2})}\right| + \right. \\ \left. +\delta_n^{2(s+2)}(y_i; x^{**}_{j-2})\left|\frac{\overline{\Pi}_i(y_i)}{\overline{\Pi}_i(x^{**}_{j-2})}\right|\right) \geq c_{37}n,\end{gathered} \tag{98}$$

аналогично

$$|\underline{P}'_i(y_i)| \geq c_{37}n. \tag{99}$$

Из (38) для всех $x \in \mathbb{I}$ следует

$$\begin{gathered}\left|\overline{K}_i(x)\right| = \left|T_{j+2}(x) - \chi(x; x^*_{j+2}) - \frac{1}{2}(T_{s+2,n_1}(x; x^*_{j-2}; s; Y) - \right. \\ \chi(x; x^*_{j-2})) - \frac{1}{2}(T_{s+2,n_1}(x; x^{**}_{j-2}; s; Y) - \chi(x; x^{**}_{j-2})) + \\ \left. + \left(\chi(x; x^*_{j+2}) - \frac{1}{2}\chi(x; x^*_{j-2}) - \frac{1}{2}\chi(x; x^{**}_{j-2})\right)\right| \leq \\ \leq 2C_{15,s+2} + 2 =: C_{38}.\end{gathered} \tag{100}$$

Аналогично,

$$|\underline{K}_i(x)| \le C_{38}. \tag{101}$$

Наконец положим

$$K_i(x) := \begin{cases} \left|\frac{R'(y_i)}{\overline{K}'_i(y_i)}\right| \overline{K}_i(x), & \text{если} \quad R'(y_i) sign\Pi(x_{j+2}) \ge 0, \\ \left|\frac{R'(y_i)}{\underline{K}'_i(y_i)}\right| \underline{K}_i(x), & \text{если} \quad R'(y_i) sign\Pi(x_{j+2}) < 0. \end{cases} \tag{102}$$

Л е м м а 12. *Имеют место соотношения*

$$|R'(x) + K'_i(x) - G'_2(x)| \le c_{39} \frac{|x - y_i|}{n^{r-2}}, \quad x \in O_i, \tag{103}$$

$$\|K_i\| \le \frac{c_{40}}{n^r} \tag{104}$$

$$K'_i(x)\Pi(x) \ge 0, \quad x \in \mathbb{I} \setminus O_i \tag{105}$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Сначала докажем равенство

$$R'(y_i) + K'_i(y_i) - G'_2(y_i) = 0. \tag{106}$$

Действительно, по условию $G'_2(y_i) = 0$. Если

$$R'(y_i) sign\Pi(x_{j+2}) \ge 0,$$

то в силу (102) и (96)

$$R'(y_i) + K'_i(y_i) = R'(y_i) + \left|\frac{R'(y_i)}{\overline{K}'_i(y_i)}\right| \overline{K}'_i(y_i) =$$
$$= R'(y_i) + |R'(y_i)| sign\Pi(x_{j-2}) = R'(y_i) - |R'(y_i)| sign\Pi(x_{j+2}) = 0.$$

Если $R'(y_i) sign\Pi(x_{j+2}) < 0$, то в силу (102) и (97)

$$R'(y_i) + K'_i(y_i) = R'(y_i) + \left|\frac{R'(y_i)}{\underline{K}'_i(y_i)}\right| \underline{K}'_i(y_i) =$$
$$= R'(y_i) + |R'(y_i)|\, sign\Pi(x_{j+2}) = 0.$$

Таким образом равенство (106) доказано. Теперь заметим, что в силу (73) и неравенства Бернштейна

$$|R'(y_i)| = |R'(y_i) - G'_2(y_i)| = |\tilde{R}'(y_i) - \tilde{G}'_2(y_i)| \le$$
$$\le \|\tilde{R}' - \tilde{G}'_2\| \le c_{41} n \|\tilde{R} - \tilde{G}_2\| \le \frac{c_{42}}{n^{r-1}}.$$

С другой стороны, согласно (96) – (99)

$$\left|\overline{K}'_i(y_i)\right| > c_{37} n, \quad |\underline{K}'_i(y_i)| > c_{37} n.$$

Поэтому, с учётом (100) и (101)

$$\|K_i\| \le \frac{C_{38}c_{42}}{c_{37}n^r} =: \frac{c_{40}}{n^r}.$$

Таким образом доказано неравенство (104). Неравенство (73), (104) и неравенство Бернштейна немедленно влекут оценку

$$\|R'' + K_i'' - G_2''\| \le \frac{c_{43}}{n^{r-2}},$$

которая вместе с (106) даёт

$$\begin{aligned}|R'(x) + K_i'(x) - G_2'(x)| &= |R'(x) + K_i'(x) - G_2'(x) - R'(y_i) - K_i'(y_i) + G_2'(y_i)| \\ &= \left|\int_{y_i}^{x} (R''(t) + K_i''(t) - G_2''(t))dt\right| \le \left|\int_{y_i}^{x} \frac{c_{43}}{n^{r-2}}dt\right| = \frac{c_{39}|x-y_i|}{n^{r-2}}.\end{aligned}$$

Таким образом и неравенство (103) леммы 12 доказано. Соотношение (105) есть очевидное следствие (102), (94) и (95). Лемма доказана.

Напомним (см. (92))

$$U_i(x) := \frac{1}{n^r}(T_{j+2}(x) - T_{j-2}(x))sign\Pi(x_{j+2}^*).$$

Согласно (45)

$$U_i'(x)\Pi(x) \ge 0, \quad x \in \mathbb{I}.$$

Поскольку при $x \in O_i$

$$\delta(x; x_{j+2}^*) > c_{44}, \quad \delta(x; x_{j-2}^*) > c_{44},$$

$$\left|\frac{\Pi(x)}{\Pi(x_{j+2}^*)}\right| > c_{45}|x-y_i|n,$$

и

$$\left|\frac{\Pi(x)}{\Pi(x_{j-2}^*)}\right| > c_{45}|x-y_i|n,$$

то в силу (46)

$$|U_i'(x)| \ge \frac{c_{46}|x-y_i|}{n^{r-2}}, \quad x \in O_i. \tag{107}$$

Кроме того, согласно (38)

$$\|U_i\| = \frac{1}{n^r}\|(T_{j+2} - \chi_{j+2}) + (\chi_{j-2} - T_{j-2}) + \chi_{j+2} - \chi_{j-2}\| \le \frac{c_{47}}{n^r}$$

и согласно (44)

$$U_i \in \mathbb{T}_{(n_1-1)(s+2)+s}. \tag{108}$$

Таким образом, справедлива

Л е м м а 13. *Имеют место соотношения*

$$\|U_i\| \le \frac{c_{47}}{n^r}, \tag{109}$$

$$\left(R'(x)+K_i'(x)+\frac{c_{39}}{c_{46}}U_i'(x)\right)\Pi(x)\geq 0, x\in\mathbb{I}. \tag{110}$$

$$U_i\in\mathbb{T}_{(n_1-1)(s+2)+s}, \tag{111}$$

$$U_i'(x)\Pi(x)\geq 0,\quad x\in\mathbb{I}, \tag{112}$$

Доказательство. Соотношения (111), (109) и (112) суть соотношения (108), (104) и (105). Неравенство (110) следует из (112), (107) и (103). Действительно,

$$\begin{aligned}&\left(R'(x)+K_i'(x)+\frac{c_{39}}{c_{46}}U_i'(x)\right)\Pi(x)=\\ &=\left(R'(x)+K_i'(x)+\frac{c_{39}}{c_{46}}U_i'(x)-G_2'(x)\right)\Pi(x)+G_2'(x)\Pi(x)\geq\\ &\geq\frac{c_{39}}{c_{46}}U_i'(x)\Pi(x)+(R'(x)+K_i'(x)-G_2'(x))\Pi(x)\geq\\ &\geq\frac{c_{39}}{c_{46}}|U_i'(x)||\Pi(x)|+(R'(x)+K_i'(x)-G_2'(x))\Pi(x)\geq\\ &\geq\frac{c_{39}|x-y_i|}{n^{r-2}}|\Pi(x)|-\frac{c_{39}|x-y_i|}{n^{r-2}}|\Pi(x)|=0.\end{aligned}$$

Лемма доказана.

Наконец, из предыдущих лемм вытекает

Лемма 14. *При* $n>N_2:=\max\{N,N_1\}$ *полином*

$$\tau(x)=V_n(x;G_1)+R(x)+\sum_{i=0}^{2s-1}\left(K_i(x)+\frac{c_{39}}{c_{46}}U_i(x)\right)$$

порядка $(n-1)(s+2)+s$ *имеет свойства*

$$\tau'(x)\Pi(x)\geq 0,\quad x\in\mathbb{R},$$

$$\|f-\tau\|\leq\frac{c}{n^r}.$$

Доказательство. В самом деле, первое неравенство леммы следует из соотношений (56) леммы 7, (74) леммы 11 и (110) леммы 13. Второе неравенство леммы следует из соотношений (57) леммы 7, (73) леммы 11, (104) леммы 12 и (109) леммы 13. Лемма доказана.

Таким образом при $n>N_2(Y)$ теорема доказана. Для $n\leq N_2(Y)$ теорема является следствием частного случая $n=0$, который вытекает из неравенства Уитни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Pleshakov M.G. *Comonotone Jackson's Inequality,* J. Approx. Theory, **99** (1999), 409–421.
2. Гилевич Я., Шевчук И.А. *Комонотонное приближение*, Фунд. и прикл. математика, **2** (1996), 2, 319–363.
3. Дзюбенко Г.А. *Поточечная оценка комонотонного приближения,* УМЖ, **46** (1994), 11, 1467–1472.
4. Никольский С.М. *О наилучшем приближении многочленами функций, удовлетворя-*

ющих условию Липшица, Изв. АН СССР, сер. мат., **10** (1946), 4, 295–317.
5. Шевчук И.А. *О коприближении монотонных функций,* ДАН СССР, **308** (1989), 3, 537–541.
6. Шевчук И.А. *Приближение монотонных функций монотонными многочленами,* Матем. сборник., **183** (1992), 5, 63–78.
7. Шведов А.С. *Теорема Джексона в L_p, $0 < p < 1$, для алгебраических многочленов и порядки комонотонных приближений*, Мат. зам., **25** (1979), 1, 107–117.
8. Шевчук И.А. *Приближение многочленами и следы непрерывных на отрезке функций.* "Наукова думка", Киев, 1992, 225 стр.
9. Шведов А.С. *Комонотонное приближение функций многочленами,* ДАН СССР, **250** (1980), 1, 39–42.
10. Шведов А.С. *Коприближение кусочно-монотонных функций многочленами,* Мат. заметки, **30** (1981), 6, 839–846.
11. Beatson R.K., Leviatan D. *On comonotone approximation,* Canad. Math. Bull. **26** (1983), 220–224.
12. DeVore R.A. *Degree of Approximation,* Approximation theory II, (Lorentz G.G., Chui C.K., Schumaker L. eds.), New York: Acad. Press, 1976, 117–162.
13. DeVore R.A. *Monotone Approximation by Polynomials,* SIAM J. Math. Anal., **8** (1977), 5, 906–921.
14. DeVore R.A., Yu X.M. *Pointwise Estimates for Monotone Polynomial Approximation,* Constr. Approx., **1** (1985), 4, 323–331.
15. Leviatan D. *Pointwise Estimates for Convex Polynomial Approximation.* Proc. Amer. Math. Soc., **98** (1986), 471–474.
16. Leviatan D., Shevchuk I.A., *Some Positive Results and Counterexamples in Comonotone Approximation*, J. Approx. Theory, **89** (1997), 195-206.
17. Newman D.J., Passow E., Raymon L. *Piecewise monotone polynomial approximation,* Trans. Am. Math. Soc., **172** (1972), 465–472.
18. Passow E., Raymon L., Roulier J.A. *Comonotone polynomial approximation,* J.Approx.Theory, **11** (1974), 221–224.
19. Passow E., Raymon L. *Monotone and comonotone approximation,* Proc. Amer. Math. Sos., **42** (1974), 390–394.
20. Shevchuk I.A. *Whitney's Inequality and Coapproximation*, East Journal on Approximations, **1** (1995), 4 , 479–500.
21. Плешаков М.Г. *О кусочно-монотонном приближении периодических функций тригонометрическими полиномами*, Теор. основы и конструирование численных алгоритмов решения задач мат. физики, тез. докл. 11-ой Всеросс. конфер., Пущино, 1996.
22. Стечкин С.Б. *О наилучшем приближении периодических функций тригонометрическими полиномами*, Доклады АН СССР, **83** (1952), 5, 651–654.
23. Дзядык В.К. *Введение в теорию равномерного приближения функций полиномами.* "Наука", М., 1977, 512 стр.